

Koronavaksinering av barn og unge mellom 5- 11 år og 12- 15 år

Oslo kommune vaksinerer nå barn og unge mellom 5-11 år og 12-15 år.

Husk at foresatte må samtykke til vaksinasjon og fylle ut egenerklæringsskjemaet på vegne av barnet.

Om koronavaksine

Det er frivillig å la barnet sitt vaksineres mot covid-19. Vaksinerer mot koronavirus (covid-19) bidrar til å redusere risiko for å bli syk og beskytter de som kan bli alvorlig syke, samtidig som det reduserer smittespredning.

Barn 5-11 år med enkelte underliggende grunnsykdommer bør vaksineres med 2 doser med barnevaksinen Comirnaty med 8-12 ukers intervall. For øvrige barn mellom 5-11 år vurderes en dose av barnevaksinen med Comirnaty å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 der barnet/foresatte ønsker det. Samme intervall mellom dosene benyttes.

Ungdom i aldersgruppen 12-15 år kan vaksineres med 1 eller 2 doser Comirnaty hvis ungdommen/foresatte ønsker det. Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19. Dose 2 kan ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose. For de som har kroniske sykdommer kan dose 2 være særlig aktuelt. Det anbefales 8-12 uker mellom dosene.

Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon.

Bivirkninger kan oppstå 1-2 dager etter vaksinasjon, men er som oftest milde/moderate og går over etter noen dager. De vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine. Tilstanden oppstår oftest innen en uke etter andre dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen én måned. Tilstanden gir brystmerter, tungpust, hjertebank og feber. Ved slike symptomer må lege oppsøkes og barnet/ungdommen undersøkes. Norske hjerteleger har vurdert at covid-19 sykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen, og at denne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine. Mer informasjon om vaksinen finnes på fhi.no.

Vaksinering på vaksinesenter

For barn 12-15 år er det mulig å få vaksinen på vaksinesenter via drop-in. For barn mellom 5-11 år må foresatte kontakte vaksinesenteret for timeavtale.

Foresatt(e) må samtykke til vaksinering

Alle barn og unge under 16 år, må ha samtykke fra foresatt(e) før de kan vaksineres. Samtykke må gis for hver dose. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Fra barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter på helsehjelpen/vaksinasjon skal barnet få informasjon og mulighet til å si sin mening før samtykke gis. Det gjelder senest fra barnet fyller 7 år. Det skal legges vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet. Fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Samtykkeskjemaet (1) og egenerklæringsskjema (2) må fylles ut og medbringes til vaksinering.

(1) Samtykkeskjema

Jeg/vi ønsker at barnet mitt/vårt vaksineres mot covid-19:

Barnets navn: _____ Fødselsdato: _____

Foresatt 1:

Fullt navn (skriv tydelig): _____

Telefonnummer: _____

Underskrift: _____

Foresatt 2

Fullt navn (skriv tydelig): _____

Telefonnummer: _____

Underskrift: _____

☐ **Kryss av her hvis du har foreldreansvaret alene**

(2) Egenerklæringsskjema for koronavaksine

Når barnet skal vaksineres mot koronavirus er det viktig at de som skal vaksinere får relevant informasjon om barnets helsetilstand. Foresatte må fylle ut skjemaet på vegne av barnet.

NB! Husk å ta med ferdig utfylt skjema til vaksinetimen

Opplysninger om barnet som skal vaksineres	
Etternavn, fornavn:	
Fødsels- og personnummer/ D-nummer:	

Opplysninger om foresatt(e)		
Etternavn, fornavn:		
Telefonnummer:		

Informasjon om barnet sin helse	Ja	Nei
1. Har barnet ditt hatt korona? Hvis ja, barn 5-15 år kan vaksineres med en vaksinedose tidligst 3 måneder etter gjennomgått infeksjon.		
2. Føler barnet ditt seg syk og har feber? (38 grader eller mer). Hvis ja, da må barnet vente til hun/han er frisk, uten tegn til forkjølelse eller feber før hun/han kan vaksineres. Det anbefales å ta hurtigtest.		
3. Har barnet ditt økt blødningstendens pga. bakenforliggende sykdom? Hvis ja, er det avklart med barnet sin lege om hun/han skal ha vaksine? Har barnet ditt blødersykdom og behandles med koagulasjonsfaktor? Hvis ja, bør barnet vaksineres samme dag som siste dosering med koagulasjonsfaktor. (De som har økt blødningstendens pga. blodfortynnende medisiner kan vaksineres som normalt).		
4. Har barnet ditt tidligere opplevd anafylaktisk sjokk? Anafylaktisk sjokk er en kraftig allergisk reaksjon som krever akutt helsehjelp, og er utløst av for eksempel medisiner, vaksiner eller mat.		

Hvis ja, da må barnet vaksineres på vaksinasjonssenteret med lege til stede og vente i 1 time etter vaksinasjonen. Kontakt vaksinesenteret for å bestille time.		
5. Har barnet ditt nylig fått andre vaksiner, som influensavaksinen, HPV eller lignende? Hvis ja, når? Det bør gå minimum 7 dager mellom vaksiner.		

Gravide og ammende kan vaksineres.